

# Przygotowanie do kolonoskopii

Na badanie proszę przyjechać z osobą towarzyszącą. Czas trwania badania to około 30 minut. Ponieważ przed badaniem podajemy dożylnie sedację (midazolam oraz fentanyl – leki o działaniu uspokajającym, nasennym oraz przeciwbólowym) – nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych przez 12 godzin po ich otrzymaniu

Leki przewlekle stosowane powinny być nadal przyjmowane. Modyfikacji wymaga leczenie cukrzycy oraz leczenie przeciwkrzepliwe – po konsultacji z endoskopistą i/lub lekarzem rodzinnym

Przed badaniem należy zdjąć biżuterię

Preparat CITRAFLEET (wydawany na receptę)

## **W przeddzień badania:**

pacjent wypija sporządzony roztwór – 150 ml i popija 2-3 litrami wody lub innego płynu niegazowanego (herbata, napoje).

Wodę lub inny płyn należy spożywać w tempie co najmniej 250-500ml/ godzinę

## **W dniu badania:**

pacjent wypija sporządzony roztwór – 150 ml i popija 2-3 litrami wody lub innego płynu niegazowanego (herbata, napoje) – ostatnia dawka wody powinna być spożyta na 4 godziny przed kolonoskopią

## **DIETA i CZAS STOSOWANIA LEKU**

**Proszę o uważne przeczytanie poniższych zaleceń**

**nie można nic jeść** już w **przeddzień badania** (można pić klarowne płyny)

**na 5-7 dni przed badaniem należy przestać spożywać pokarmy z pestkami – w tym ciemnego pieczywa, otrębów, płatków owsianych itp**

Godzina kolonoskopii	Pierwsza dawka w przeddzień badania	Druga dawka w dniu badania	Koniec picia drugiej dawki
7:30	14:00	1:30	3:30
8:30	14:00	2:30	4:30
9:30	14:00	3:30	5:30
10:30	14:00	4:30	6:30
11:00	14:00	5:00	7:00

**Dawka leku to Citrafleet 1 saszetka w 150ml wody + 2-3 litry wody**