

# Przygotowanie do kolonoskopii

Na badanie proszę przyjechać z osobą towarzyszącą. Czas trwania badania to około 30 minut. Ponieważ przed badaniem podajemy dożylnie sedację (midazolam oraz fentanyl – leki o działaniu uspokajającym, nasennym oraz przeciwbólowym) – nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych przez 12 godzin po ich otrzymaniu

Leki przewlekle stosowane powinny być nadal przyjmowane. Modyfikacji wymaga leczenie cukrzycy oraz leczenie przeciwkrzepliwe – po konsultacji z endoskopistą i/lub lekarzem rodzinnym  
Przed badaniem należy zdjąć biżuterię

## Preparat **Moviprep** (wydawany na receptę)

### **W przeddzień badania:**

pacjent wypija sporządzony roztwór – 1litr, po wypiciu leku powinno się spożyć 1 litr wody (aby się nie odwodnić)

### **W dniu badania:**

pacjent wypija sporządzony roztwór – 1litr – ostatnia dawka powinna być spożyta na 4 godziny przed kolonoskopią  
po wypiciu leku powinno się spożyć 1 litr wody (aby się nie odwodnić)

### **DIETA**

**pacjent nie może nic jeść już w przeddzień badania (można pić klarowne płyny)**

**na 5-7 dni przed badaniem należy przestać spożywać pokarmy z pestkami**

Godzina kolonoskopii	Pierwsza dawka w przeddzień badania	Druga dawka w dniu badania	Koniec picia drugiej dawki
7:30	14:00	2:30	3:30
8:30	14:00	3:30	4:30
9:30	14:00	4:30	5:30
10:30	14:00	5:30	6:30
11:00	14:00	6:00	7:00

**Dawka leku to 1 litr przygotowanego leku moviprep**