

Przygotowanie do kolonoskopii

Na badanie proszę przyjechać z osobą towarzyszącą. Czas trwania badania to około 30 minut. Ponieważ przed badaniem podajemy dożylnie sedację (midazolam oraz fentanyl – leki o działaniu uspokajającym, nasennym oraz przeciwbólowym) – **nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych przez 12 godzin po ich otrzymaniu**

Leki przewlekle stosowane powinny być nadal przyjmowane. Modyfikacji wymaga leczenie cukrzycy oraz leczenie przeciwkrzepliwie – po konsultacji z endoskopistą i/lub lekarzem rodzinnym
Przed badaniem należy zdjąć biżuterię

Preparat **CITRAFLEET (wydawany na receptę)**

W przeddzień badania:

pacjent wypija sporządzony roztwór – 150 ml i popija 2-3 litrami wody lub innego płynu niegazowanego (herbata, napoje).

Wodę lub inny płyn należy spożywać w tempie co najmniej 250-500ml/ godzinę

W dniu badania:

pacjent wypija sporządzony roztwór – 150 ml i popija 1- 1.5 litrami wody lub innego płynu niegazowanego (herbata, napoje) – ostatnia dawka wody powinna być spożyta na 4 godziny przed kolonoskopią

DIETA i CZAS STOSOWANIA LEKU

pacjent nie może nic jeść już w przeddzień badania, nawet śniadania (można pić klarowne płyny: pomijając rosół, bulion, kisiel, mleko, gęste soki)

na 5-7 dni przed badaniem należy przestać spożywać pokarmy z pestkami – w tym ciemnego pieczywa, otrębów, płatków owsianych itp

Godzina kolonoskopii	Pierwsza dawka w przeddzień badania	Druga dawka w dniu badania	Koniec picia drugiej dawki
7:30	14:00	1:30	3:30
8:30	14:00	2:30	4:30
9:30	14:00	3:30	5:30
10:30	14:00	4:30	6:30
11:30	14:00	5:00	7:00
12:30	14:00	6:00	8:00