

Przygotowanie do kolonoskopii

Na badanie proszę przyjechać z osobą towarzyszącą. Czas trwania badania to około 30 minut. Ponieważ przed badaniem podajemy dożylnie sedację (midazolam oraz fentanyl – leki o działaniu uspokajającym, nasennym oraz przeciwbólowym) – **nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych przez 12 godzin po ich otrzymaniu**

Leki przewlekle stosowane powinny być nadal przyjmowane. Modyfikacji wymaga leczenie cukrzycy oraz leczenie przeciwkrzepliwe – po konsultacji z endoskopistą i/lub lekarzem rodzinnym
Przed badaniem należy zdjąć biżuterię

Preparat Plenvu (wydawany na receptę)

W przeddzień badania:

pacjent wypija sporządzony roztwór – pacjent wypija sporządzony roztwór – 1 saszetkę rozpuścić w 1litr wody i dodatkowo wypić 1 litr wody

W dniu badania:

pacjent wypija sporządzony roztwór – pacjent wypija sporządzony roztwór – saszetkę A i saszetkę B rozpuścić w 1litr wody i dodatkowo wypić 1 litr wody
Ostatnia dawka powinna być spożyta na 4 godziny przed kolonoskopia

DIETA

pacjent nie może nic jeść już w przeddzień badania, nawet śniadania (można pić klarowne płyny: pomijając rosół, bulion, kisiel, mleko, gęste soki)

na 5-7 dni przed badaniem należy przestać spożywać pokarmy z pestkami

Godzina kolonoskopii	Pierwsza dawka w przeddzień badania	Druga dawka w dniu badania	Koniec picia drugiej dawki
7:30	14:00	2:30	3:30
8:30	14:00	3:30	4:30
9:30	14:00	4:30	5:30
10:30	14:00	5:30	6:30
11:00	14:00	6:00	7:00

